
UN REGISTRO DE PHOTINA PILOSA CHOPARD, 1912
(MANTODEA: VATIDAE: PHOTININAE) PARA COLOMBIA

Julián A. Salazar E. (M.V.Z.)
MHN-UC, Universidad de Caldas
A.A. 275, Manizales

RESUMEN

Se registra por primera vez para Colombia, la especie *Photina pilosa* Chopard, 1912 mediante un macho depositado en la colección entomológica de la Facultad de Ingeniería forestal de la Universidad del Tolima, Ibagué.

Palabras claves: Colombia, Mantodea, Vatiidae, Photininae, *Photina pilosa*, Tolima, registro.

ABSTRACT

Photina pilosa Chopard, 1912 is recorded for the first time in Colombia, through a male deposited in the entomological collection, Tolima University, Ibagué.

Key words: Colombia, Mantodea, Vatiidae, Photininae, *Photina pilosa*, Tolima, record.

Continuando con la búsqueda de nuevos registros de Mantodea para Colombia, concretamente con las especies de la subfamilia *Photininae* (G-T., 1919) (ver APOLINAR, 1924; AGUDELO & CHICA, 2001; SALAZAR, 2000 a,b,c), hemos hallado un ejemplar macho de la especie *Photina pilosa* Chopard, 1912, revisando la colección de insectos de la facultad de Ingeniería forestal de la Universidad del Tolima en Febrero 26 del presente año. Dicho espécimen (Fig. 1), en buen estado de conservación, corresponde al género *Photina* Burmeister, 1838, que según TERRA (1995) comprende 10 especies conocidas principalmente de Brasil y las Guayanas.

P. pilosa fue descrita por CHOPARD en 1912 por tres machos procedentes de Godibert-Maroni, Nouveau-Chantier, Guyana Francesa, y lo que la hace notablemente diferente de otras especies del grupo es su intensa y alargada pubescencia distribuida en el abdomen y en las patas medias y posteriores. Exceptuando lo anterior, esta especie recuerda sólo a *Photina vitrea* Burmeister del Brasil y la Guyana Francesa que es más pequeña y carece de dicho hirsutismo. Ahora incluimos a Colombia, lo que amplía considerablemente su rango de dispersión. *Photina pilosa* Chop., fue figurada por BEIER

(1935) como "*Metriomantis pilosa*" Chopard y citada también por CERDÁ (1997) para Venezuela.

Otros detalles de la especie fueron publicados por GIGLIO-TOS (1927) en su extensa reseña mundial de los Mantodea.

Photina pilosa: 1 macho, Colombia; Ibagué, Tolima, en maleza, 30-Ag.90 (S.L. leg.).

AGRADECIMIENTOS

A Pedro E. Galeano (área de Entomología, Universidad del Tolima) y Gloria M. Ariza (Facultad de Biología) por su estupendo apoyo.

BIBLIOGRAFÍA

AGUDELO, A. & CHICA, L.M., 2001.- Presencia del género *Paraphotina* G-T., 1915 (Mantodea Vatiniae: Photininae) en Colombia. *Bol. Cient. Mus. Hist. Nat. U. Caldas*, 5: 33-37.

APOLINAR, M., 1924.- Especies nuevas y observaciones sobre Dermópteros (sic) y Orthopteros colombianos. *Bol. Soc. Col. Cienc. Nat. Inst. La Salle*, 75: 45-50.

BEIER, M., 1935 a.- Mantodea, *Mantidae*. *Gen. Insect.*, 203: 121-122, + 8 pls.

CERDÁ, F., 1997.- Mantodea de Venezuela. Géneros y lista preliminar de especies, V. Flia *Mantidae* (subf. *Photininae*). *Bol. Ent. Ven.* (NS), 12 (1): 33-42.

CHOPARD, L., 1912.- Contribution a la faune de Orthopteres de la Guyane Francaise. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 80: 323-324.

GIGLIO-TOS, E., 1927.- Orthoptera, Mantidae. *Das Tierreich*, 50: 324-326. Berlin und Leipzig.

SALAZAR, J.A., 2000.- Mántidos contenidos en la colección "Francisco Luis Gallego" Fac. Agronomía, Universidad Nacional, sede Medellín, Antioquia (Insecta: Mantodea). *Bol. Cient. Mus. Hist. Nat. U. Caldas*, 4: 63-69.

_____, 2000b.- Praying Mantis contents in the "Entomological Museum" from Faculty of Sciences, Valle University, Cali (Insecta: Mantodea). *Bol. Cient. Mus. Hist. Nat. U. Caldas*, 4: 70-76.

_____, 2001.- Mantids of Colombia in the MNHN, Paris (and other Museums). *Bol. Cient. Mus. Hist. Nat. U. Caldas*, 5: 128-131.

TERRA, P.S., 1995.- Revisao sistématica dos géneros de Louva-a-Deus de Regiao Neotropical (Mantodea). *Rev. bras. Ent.*, 39(1): 1-94.




Figura 1. *Photina pilosa* Chop. (Lateral).